

NOUVELLE ESPÈCE DE LIODES DE L'INDE,

PAR M. G. PORTEVIN.

Les *Lioididæ* de l'Inde, dont j'ai donné la révision (Coleoptera, I, p. 75-83, 1926) sont peu nombreux; le genre *Liodes*, en particulier, n'était jusqu'ici représenté que par trois espèces. Voici la description d'une quatrième, très remarquable, comme on le verra, par les caractères distinctifs du ♂.

L. longispina nov. sp. *Brunneo rubra, ovalis, fortiter convexa, parum nitida. Caput sat fortiter et dense punctatum, fronte quadripunctata, antennis sat gracilibus; pronotum parum transversum, angulis posticis rectis, dense et sat fortiter punctatum; elytra regulariter, striis grosse punctatis ornata, humeris curta stria obliqua munitis intervallis tenuissime et laxè punctatis, alternis grossis punctis sparse munitis.* ♂ *Femoris posterioribus subtus angulatim obtuse dilatatis, tibiis gracilibus, bisinuatatis, ad apicem dilatatis, angulo externo longe prolongato, extus parce spinis munitis.* Long. 5 mm.

1 ♂ de Simla (collection Grouvelle).

A peu près de la taille et du facies de *L. cinnamomea* et *L. major*




Fig. 1. — Extrémité du fémur et tibia postérieur du mâle chez le *Liodes cinnamomea* (C) et chez le *Liodes longispina* (L).

Port. mais de couleur plus foncée et bien plus convexe. Le pronotum n'est nullement rétréci en arrière, de sorte qu'il forme une courbe continue avec les élytres, comme chez *major*; les élytres

ont également, comme cette dernière espèce, une strie subhumérale, mais plus courte et plus rapprochée de la marge, avec laquelle elle se confond rapidement. C'est donc de *major* qu'elle se rapproche le plus, mais elle en diffère par la couleur plus foncée, la convexité du corps plus grande, et la ponctuation de l'avant-corps plus forte et plus serrée. Le ♂ a les tibias postérieurs grêles, bisinués, dilatés au bout, avec l'angle externe prolongé en une longue apophyse, disposition unique jusqu'à présent dans le genre, et à cause de laquelle je crois devoir créer pour cette espèce une nouvelle coupe sous-générique que j'appellerai *Acantholiodes*.

Il serait intéressant de pouvoir comparer à celui-ci le ♂ de *L. major*, qui provient de la même région : malheureusement l'unique exemplaire typique est une ♀, contrairement à ce que j'ai dit lors de sa description.